

CBNPC (stades locaux) : immunothérapie (néo)adjuvantes

Références	Promoteur	Design	Sélection	Bras	N pts	R0	SSP (médiane)	Survie			p
								médiane	2 ans	5 ans	
<b>AC anti-PDL1</b>											
2022 Forde (1)	AstraZeneca Bristol Myers Squibb	phIII R « CheckMate 816 » NEOADJUVANT	CBNPC st IB à III A résécables	Nivolumab (360 mg)+ chimio à base platine : 3x	179	83,2 %	31,6 m		82,7 %		S
				Chimio à base platine : 3x	179	75,4 %	20,8 m		70,6 %		
<b>AC anti-PD1</b>											
2022 O'Brien (2)	Merck Sharp & Dohme	phIII R double-aveugle « PEARLS/KEYNOTE- 091 » ADJUVANT	CBNPC st IB à III complètement réséqués	Chimio + pembrolizumab (200 mg) (18 mois)	590		53,6 m		89 %		NS
				Chimio + placebo	578		42 m		88 %		

#### Références

1. Forde PM, Spicer J, Lu S, Provencio M, Mitsudomi T, Awad MM, et al. Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer. N Engl J Med [Internet]. 26 mai 2022 [cité 10 mars 2023];386(21):1973-85. Disponible sur: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2202170>
2. O'Brien M, Paz-Ares L, Marreaud S, Dafni U, Oselin K, Havel L, et al. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy for completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (PEARLS/KEYNOTE-091): an interim analysis of a randomised, triple-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol. oct 2022;23(10):1274-86.